

LE CONTRÔLE DU FACTEUR BACTERIEN


1-Pour le Patient SAIN



La Prévention primaire :

Tout patient sain est susceptible de développer une inflammation gingivale en présence de plaque microbienne. Cette inflammation peut déclencher, chez certains patients (patients à risque), une résorption de l'os de soutien des dents.

Il faut donc être attentif aux signes d'inflammation qui peuvent apparaître au niveau du parodonte et maintenir les dépôts de plaque bactérienne et de tartre en dessous d'un seuil compatible avec la santé gingivale.



<http://www.papilli.fr>

La prévention primaire consiste à prévenir l'apparition des signes d'inflammation gingivale (ou gingivite) par des manœuvres de contrôle de plaque exécutées par le patient, mais aussi par des manœuvres professionnelles périodiques.

L'Hygiène chez le patient sain :

Ordonnance type :

Brosse à dent à petite tête souple (15/100 ou chirurgicale)

Dentifrice

Fil de soie dentaire ciré

Miroir buccal (type Dentoglass Inava)




Solution révélatrice de plaque (type Dentoplaque Inava)



Technique de brossage :



Il faut brosser toutes des faces de toutes les dents en commençant par les faces linguales des dents du bas avec des petits mouvements d'oscillation horizontaux ou verticaux en allant au contact de la gencive. Il ne faut pas brosser la surface de la gencive mais la jonction avec la dent, avec une pression douce.



<http://www.papilli.fr>

Le nettoyage des espaces inter dentaire est réalisé une fois par jour. Il faut franchir le point de contact avec une traction horizontale sur le fil et non verticale pour ne pas léser la papille gingivale.

Examen et diagnostic par le praticien

Une à deux visites annuelles sont indiquées.

Le diagnostic repose sur

1) l'examen clinique qui permet d'évaluer :

- La présence de dépôts mous ou calcifiés
- Les signes d'inflammation gingivale
- L'absence de poche parodontale par un sondage prudent

2) la radiographie

Quatre clichés bite wings sont réalisés pour permettre de confirmer l'absence de perte osseuse et de dépister d'éventuelles caries dentaires.

Technique de détartrage

Un détartrage supra gingival est réalisé à l'aide des ultrasons réglés sur la puissance minimale efficace. Celui-ci est suivi d'un polissage soigneux à l'aide d'une brosse rotative imprégnée de pâte abrasive fluorée.



Sujets à risque :

La prévention des maladies parodontales implique le dépistage des sujets à risque :

Facteur génétique (test PST periodontal susceptibility test),

Tabac,

Maladies systémiques (diabète, hématologiques, prise de médicaments, désordres immunitaires, grossesse)

